

すぐに役立つ暮らしの健康情報—

# こんちわ

2022年 8月号



## エアコンの設定温度

「エアコンの設定温度は28℃に」という言葉がよく聞かれます。

これは地球温暖化対策のために、環境省が「クールビズ」を推進した頃から一般的になりました。当時のオフィスでは、26℃に設定されることが多かったエアコンを、「夏場はネクタイを外すことで28℃にしましよう」というのが本来の趣旨でした。

近年、室内で熱中症になる方が増えています。設定温度28℃にこだわらず、室内で暑さを感じたときは、エアコンを適切に調整するようにしましょう。

エアコンの設定温度で注意したいのは、エアコンの経年劣化やメンテナンス不足、住宅環境や設置の仕方によって、設定温度と室温が一致しないケースがあることです。

室内には、温度計（できれば湿度計がついたもの）を用意して、設定温度と室温に差がないか確認しましょう。

とはいっても、電気代の値上がりや節電の呼びかけがなされるなか、できるだけエアコンの設定温度は下げたくないという方もいらっしゃるでしょう。機種にもますが、設定温度を2℃上げると、月に500円程度、電気代を節約できるという試算もあります。そこでエアコンは、扇風機と併用するようになります。扇風機を天井に向けて、エアコンの風向きと合わせて風を送りだすと効率的です。エアコンの設定温度を下げなくても、涼しく感じられるようになります。

A vertical illustration featuring a cartoon man in a blue shirt and tan pants, holding his lower back in pain. He is standing on a white surface with colorful geometric patterns (blue, pink, green) in the background. To the left of the man is a large, stylized vertical text composed of multiple layers of colored rectangles (purple, yellow, green, blue) forming the characters '坐骨神経痛の原因'. To the right of the man are four vertical columns of Japanese text with red outlines: 'ざこつ' (zakotsu), 'しんけい' (shinkei), 'つら' (tsura), and 'はんこ' (hanako). The overall style is colorful and modern.



坐骨神経痛は、立ち上がるのことや歩行といった日常の動作に多大な苦痛をもたらします。下半身の痛みや痺れ、張りといった症状が起きる原因となるものは、なんでしょうか？

## 下半身を動かす坐骨神経


椅子や畳に座つてみてください。お尻の骨が座面にあたつているのがわかると思います。この骨が坐骨です。

そして坐骨神経は、腰のあたりから坐骨を通り、つま先まで伸びている神経のことと言います。鉛筆ほどの太さがあり、長さは1m


この坐骨神経になんらかの圧迫

坐骨神経痛は病名ではなく、下半身の痛みや痺れ、張りが起きて

**坐骨神経痛は病名ではない**



## 腰椎間板ヘルニア



いる症状を表す言葉です。

例えば胃痛（という症状）は、胃炎や胃潰瘍、胃がんなどが原因となつて起ります。

同じように坐骨神経痛も、さまざまな病気が原因となつていて、なかでも「腰椎間ヘルニア」と「腰部脊柱管狭窄症」が多くを占めています。

**腰椎間板ヘルニア**

腰にある椎間板が変形したり、

腰椎間板ヘルニア





## QOLを高める！ホームドクター・アドバイス




腰椎間板ヘルニアでは、痛みや  
通っている管、「脊柱管」があり

### 腰部脊柱管狭窄症


飛び出し、周囲にある神経を刺激することで、腰椎間板ヘルニアが起ります。

腰椎間板ヘルニアで頻度の多い症状は、腰を曲げたときに起こる、お尻や太ももの裏の痺れや痛みです。

### 正常な腰部脊柱管



### 腰部脊柱管狭窄症



腰椎間板ヘルニアでは、痛みや

ふたつの病気の治療法

痛みやしづらさが

になります。

腰椎間板ヘルニアでは、痛みや  
通っている管、「脊柱管」があり  
痛みやしづらさが  
になります。



腰椎間板ヘルニアでは、痛みや  
通っている管、「脊柱管」があり  
痛みやしづらさが  
になります。

すでに神経の障害が進行しているケースでは、手術療法が選択肢になります。腰部脊柱管狭窄症の手術で代表的なものは、「椎弓切除術」です。これは、神経を圧迫している椎弓という骨を取り除くことで症状を改善します。


坐骨神経痛に悩まれている方は、まず整形外科を受診してください。そして、原因になつていてる病気を特定し、それに合わせた治療を受けるようにしてください。

炎症を抑える薬を使用した薬物療法や、痛みのある部分に麻酔薬を注射する「神経ブロック療法」がおもな治療法になります。

腰椎間板ヘルニアの場合、多くは比較的短期間で症状が軽くなるとされています。ただ、強い痛みがあつて日常生活に支障があるケースでは、手術療法が検討されることがあります。

- **腰椎すべり症** 腰椎がずれるごとによって脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されて症状が出る。
- **梨状筋（りじょうきん）症候群** 股関節を支える梨状筋が圧迫され、疼痛が起きている状態。

### 坐骨神経痛 —そのほかの病気



# 血尿が知らせる! 膀胱がん

膀胱がんには、病気を知らせる目で見えるサインがあります。それが、血尿です。

血尿が出たら、放置せずに泌尿器科を受診してください。

**膀胱がんとは**

膀胱は骨盤のなかにある袋状の臓器で、腎臓でつくられた尿を溜め、ある程度の量になつたら脳に指令を送り、体外に排出する働きをしています。

膀胱がんは、膀胱にできるがんの総称です。膀胱がんにはいくつか種類がありますが、ほとんどは、膀胱の内部の粘膜にできる「尿路上皮がん」となっています。

年齢別にみた膀胱がんの罹患率

膀胱がんは、男女とも60歳代から増加しています。男女別では、男性の罹患率が女性の約4倍になっています。

膀胱がんの発症リスクとしては、喫煙がもっとも大きな要因となっています。喫煙している人は吸わない人に比べて4倍、過去に喫煙した人は2倍程度、膀胱がんになりやすいことが判明しています。

そのほかには、ナフチルアミン、ベンジジン、アミノビフェニルといった化学物質との慢性的な接触もリスクにあげられています。

**膀胱がんの病期（ステージ）**

膀胱がん（尿路上皮がん）の病期（ステージ）は、大きく五つに分けられています。


0期 膀胱の内側の組織に腫瘍ができるいる状態。

I期 がんが、膀胱の内側の粘膜の下の層まで浸潤している状態。

II期 がんが、膀胱の筋肉の層に浸潤している状態。

III期 がんが、膀胱から周囲の生殖器（前立腺、子宮、膣など）まで浸潤している状態。

IV期 がんが、膀胱から腹壁または骨盤壁まで浸潤し、リンパ節や体内的ほかの部位へ転移していることがある状態。



# メディカル・プロファイリング

がんの治療効果を表す目安としてよく、「五年生存率」が使われます。膀胱がんの場合、I期の段階で治療を始めれば、5年生存率は約9割と高い割合になっています。一方、IV期では2割程度と、大きく数字が落ちます。

**血尿が出たら泌尿器科へ**

膀胱がんを早期発見するための重要な鍵があります。それは「血尿」です。

血尿には、目で見てわかるものと、顕微鏡検査をしなければわからないものがありますが、膀胱がんでは、目で見てわかる血尿が多くなっています。

血尿の原因は、膀胱がん以外にもさまざまあります。また、血尿は出たり出なかったりすることや、膀胱がんによる血尿は、初期の段階では痛みをともなわないという特徴もあります。

ただ放置していると、がんが進行してしまう恐れがあります。心

膀胱内に、抗がん剤やBCG（がん細胞を攻撃する免疫の力を強める薬）を注入する治療。

## ● 膀胱内注入療法

膀胱を切除する手術。腫瘍の性質を調べる検査もかねている。

## ● 切除術（TURBT）

内視鏡による経尿道的膀胱腫瘍切除術

膀胱がんの治療には、次のようなものがあります。

あたりのある方は、早急に泌尿器科で相談してください。

## 膀胱がんの治療法

ものもらいは、まぶたの汗腺や皮脂腺で細菌が増殖して、化膿する病気です。一方のはやり（麦粒腫）とはやり目（流行性角結膜炎）があります。目にできる疾患に、ものもらい（麦粒腫）とはやり目（流行性角結膜炎）があります。



## ものもらいとはやり目

ほかにも放射線治療や薬物療法などがあり、膀胱がんのステージや転移の有無などを考慮して、治療法が選択されます。

ものもらいは、他の人に移る心配はありません。抗生物質の点眼薬や内服薬、眼軟膏などの




外用薬を用いると、2～3日で症状は軽くなり、4～5日で完治するのが普通です。はやり目は、原因となるアデノウイルスの感染力がとても強いため、はやり目の方が使用したタオルからでも感染することがあります。アデノウイルスに対する特効薬はないので、対症療法が治療の中心になります。

多くの場合、発症してから約1週間がピークで、2～3週間で症状が改善されます。

はやり目は、学校感染症の第3種に分類され、この病気と診断された子どもは、出席停止となります。大人の方も他者に移さないよう、細心の注意をしなければなりません。

まぶたにトラブルが起きたら、眼科を受診してください。まずは、ものもらいかはやり目かをしっかりと確認するようにします。



# 人生100年時代の知恵

## 近隣トラブルを避ける

洗濯機や乾燥機、掃除機、冷蔵庫から発生する音。風呂やシャワーの給排水音。テレビやステレオの音。楽器の音。足音やドアの開け閉めの音。ペットの泣き声……。日常生活を送るうえでどうしても出てしまうこれらの音は「生活騒音」と呼ばれています。

### 生活騒音は取り締まれない

近隣トラブルでもっとも多いのは、生活騒音によるものです。ただ生活騒音に関しては、これを取り締まる法律はありません。

基本的には、お住いの地域やマンションの管理組合で決められたことを守りながら、お互いに配慮し合うことが必要になります。

### 4つの気配りポイント

生活騒音をできるだけ減らすために、気配りしたいポイントが4つあります。

#### ①時間帯に配慮する

日中は気にならない音でも、早朝や深夜は大きく響きます。洗濯機や掃除機は、時間を選んで使用してください。風呂やシャワーも深夜の使用は控えましょう。

#### ②音を小さくする

テレビやステレオは、できるだけ小さな音で。窓を開けているときは、とくに注意が必要です。深夜は、ヘッドホンやイヤホンを使用しましょう。

#### ③防音対策

吸音効果の高いカーテンや絨毯を使用する。洗濯機は壁から離して設置する。低騒音型の電気機器を選ぶようにする。こうした、小さな気遣いを忘れないようにしましょう。

#### ④近所づきあいを大切に

日頃から挨拶を心掛け、コミュニケーションをとることが、近隣トラブルを深刻化させないことにつながります。

もし問題が起きたときは、まずは当事者間で話し合い、それでも解決しない場合は、住宅の管理組合や地方公共団体の窓口に相談してください。




このコーナーは文字を大きくしてあります。




## \* 海辺の危険生物 \*

今年の夏は規制もほぼ緩和され、海水浴や釣りに出かける方も多いと思います。しかし、海辺には思わぬ危険生物がたくさん隠れています。これらの被害に遭うと、痛み・しびれ・腫れ・頭痛・めまい・吐き気・けいれんなどを起こし、命に係わる場合もあるので、十分な注意が必要です。



アカエイ

尾びれに毒のあるトゲがあり、砂に潜っているので踏むと刺される。



ヒヨウモンダコ

浅い海や岩場にいる。フグと同じ猛毒を持つ。超危険生物。



ウミケムシ

長く鋭い毒のあるトゲがあり、岩の割れ目や磯にいる。

ゴンズイ



胸びれと背びれに毒のあるトゲがあり、潮だまりにいることが多い。

ハオコゼ




背びれに毒のあるトゲがあり、潮だまりや海藻の中に隠れている。

**危険**

- ⚠ 見つけても絶対に触らない！
- ⚠ むやみに岩場に手を入れない！
- ⚠ 刺されたら医療機関へ！

ガンガゼ



体の周囲にトゲがあり、岩の裏などに隠れている。

カツオノエボシ



アンドンクラゲ



共に「電気クラゲ」と呼ばれ、お盆過ぎに多く現れる。

## 見逃さないで、この症状！

### 熱中症の初期症状——足がつる、くらくら感

熱中症のピークは7月～8月ですが、今年はすでに6月末から熱中症による健康被害が頻繁に報道されています。

熱中症の初期症状は、「足がつる」ことや「くらくら感（めまい、立ちくらみ）」です。このとき、倦怠感や吐き気・嘔吐、頭痛などをともなうケースが多くあります。もし、こうしたことが起きたときは、けっして軽視しないでください。

すぐにクーラーの効いた屋内や涼しい日陰に

移動し、衣類をゆるめ、保冷剤や冷えたペットボトルを巻いたタオルで、身体を冷やすようにしましょう。このとき、水分補給をすることが必要です。

初期症状が治まっても、すぐには行動しないで、休息をしっかりとってください。熱中症では、症状が急変することがあります。

熱中症でもっとも深刻な事態は、意識障害を起こすことです。

意識がないときはもちろん、呼びかけても応答が鈍い、言動がおかしいといったときは、迷わず救急車を呼んでください。



7 〈頭のストレッチの答え〉 [ヨコのカギ] ①ヤケイシ ⑤トヨトミ ⑦ノア ⑨ウキワ ⑩ヒマワリ ⑪ピン ⑫チエコシヨウ  
[タテのカギ] ①ヤマノヒ ②イト ③ショウリ ④カミワザ ⑥トキ ⑧アマビエ ⑪ワンコ ⑬キヨ

## MONTHLY COOKING



## なすとひき肉の香味炒め

### 材料 (2人分)

なす	3本	Ⓐ { ニンニク 生姜(みじん切り) } 各10g
ピーマン	2個	Ⓑ { 水 しょうゆ みりん 酢 } 大さじ3 大さじ1½ 大さじ1 小さじ1 小さじ2
豚ひき肉	150g	Ⓒ { 片栗粉 水 } 小さじ1½ 小さじ1 小さじ1 小さじ2
豆板醤	小さじ½	
ゴマ油	大さじ1	

### 作り方

- ① ナスとピーマンは小さめの乱切りにする。
- ② フライパンにゴマ油とⒶを入れ中火にかけ炒める。香りが出たらひき肉を加え炒める。色が変わったらナスを加え炒める。油が回ったらピーマンを入れ炒める。
- ③ ②に豆板醤を加え炒め、Ⓑを加え混ぜながらナスに火が通るまで炒める。Ⓒを溶いて加え混ぜ、全体にとろみがついたら火をとめる。



1人分 307 kcal

### ワンポイント

香味野菜が効いたご飯の進むおかず。  
素麺やうどんにかけても合います。  
好みで粉山椒を振っても。



クッキングアドバイザー 天野由美子

※ 食事指導を受けている場合は医師に相談しましょう。

## あなたの知らない感染症の世界

### 手足口病

手足口病は、夏に流行するウイルス性の感染症で、子どもに多くみられます。大人でも感染することがあります。感染経路は、飛沫感染や接触感染、排泄物中のウイルスが口中に入る経口感染です。潜伏期間は通常3～5日で、主な症状は、名前のとおり手・足・口の中などに赤い斑点状の水疱を伴う発疹ができます。発熱や痛み、痒みがあることもあります。重症化することは少なく、発疹は7～10日程度で自然に消えます。

**人が感染すると  
症状が重いので  
注意!!**



手足口病は、夏に流行するウイルス性の感染症で、子どもに多くみられます。大人でも感染することがあります。


感染経路は、飛沫感染や接触感染、排泄物中のウイルスが口中に入る経口感染です。潜伏期間は通常3～5日で、主な症状は、名前のとおり手・足・口の中などに赤い斑点状の水疱を伴う発疹ができます。発熱や痛み、痒みがあることもあります。重症化することは少なく、発疹は7～10日程度で自然に消えます。

人が感染すると症状が重いので注意!!

手足口病は、夏に流行するウイルス性の感染症で、子どもに多くみられます。大人でも感染することがあります。

## 頭のストレッチ

タテのカギ・ヨコのカギをヒントにクロスワードを完成させてください。



### 【ヨコのカギ】

- 役に立たないこと
- 「～に水」
- 戦国時代の武将
- 「～秀吉」
- 旧約聖書の大洪水の神話
- 「～の方舟」
- 水上に浮かぶための用具
- 夏を代表する黄色い花
- ビール～、ガラス～
- 妻の名前が入った高村光太郎の詩集

### 【タテのカギ】

- 今年は8月11日
- 繊維を細長く引き伸ばしたもの
- ～投手、～の女神
- 超人間的な技術や行為
- 新潟県の「県の鳥」
- コロナ禍に流行した疫病封じの妖怪
- 岩手県の名物「～そば」
- 京都の有名な寺「～水寺」

※答えは7ページにあります