

消化器（大腸）

1) 切除不能進行・再発大腸癌での化学療法

癌腫	レジメン略称 (レジメンブック参照)	カルテ表記	薬剤組み合わせ	投与間隔
大腸	FOLFIRI	FOLFIRI	レボホリナート+トポテシン+5-FU	2週毎
大腸	FOLFOX	FOLFOX	レボホリナート+エルプラット+5-FU	2週毎
大腸	FOLFIRI + BEV	FOLFOX + BEV	レボホリナート+トポテシン+5-FU+アバスタチン	2週毎
大腸	FOLFOX + BEV	FOLFOX + BEV	レボホリナート+エルプラット+5-FU+アバスタチン	2週毎
大腸	FOLFIRI + P-mab	FOLFIRI + P-mab	レボホリナート+トポテシン+5-FU+ベクティビックス	2週毎
大腸	sLV5FU2	sLV5FU2	レボホリナート+5-FU	2週毎
大腸	C-mab (単独)	C-mab	アービタックス	毎週
大腸	SOX + B V	SOX + B V	S-1 (内服) +エルプラット+アバスタチン	3投2休、2週毎

2) 術後化学療法

癌腫	レジメン略称 (レジメンブック参照)	カルテ表記	薬剤組み合わせ	投与間隔
大腸	FOLFOX	FOLFOX	レボホリナート+エルプラット+5-FU	2週毎

消化器（胃）

1) 切除不能進行・再発胃癌での化学療法

癌腫	レジメン略称 (レジメンブック参照)	カルテ表記	薬剤組み合わせ	投与間隔	催吐リスク
胃	SP	TS-1 + CDDP	TS-1またはエスエーワン (内服) +シスプラチン	3投2休、CDDP d 8	高度
胃	RAM単独	RAM	サイラムザ	2週毎	

消化器（膵）

癌腫	レジメン略称 (レジメンブック参照)	カルテ表記	薬剤組み合わせ	投与間隔
膵臓	FOLFIRINOX	FOLFIRINOX	レボホリナート+トポテシン++エルプラット+フルオロウラシル	2週毎
膵臓	nab - PTX	nab - PTX	パクリタキセル+アブラキサン	3投1休 (4週毎)
膵臓	GEM	GEM	ゲムシタビン	3投1休 (4週毎)

乳がん

1) 術後・術前化学療法

癌腫	レジメン略称 (レジメンブック参照)	カルテ表記	薬剤組み合わせ	投与間隔
乳	3H	3H	ハーセプチン (トラスツズマブ)	3週毎
乳	Per+HER	Per+HER	パージェタ+ハーセプチン (トラスツズマブ)	3週毎
乳	Per+HER + DTX	Per+HER + DTX	パージェタ+ハーセプチン (トラスツズマブ) +ドセタキセル	3週毎
乳	W.Pacli + HER	W.Pacli + HER	パクリタキセル+ハーセプチン (トラスツズマブ)	毎週
乳	W.Pacli	W.Pacli	パクリタキセル	毎週
乳	EC	EC	エピルビシン+エンドキサン	3週毎
乳	DTX	DTX	ドセタキセル	3週毎

2) 切除不能進行・再発乳癌での化学療法

癌腫	レジメン略称 (レジメンブック参照)	カルテ表記	薬剤組み合わせ	投与間隔
乳	カドサイラ	T - DM1	カドサイラ	3週毎
乳	BEV+PTX	BEV+PTX	アバスタチン+パクリタキセル	BEV1投1休+PTX3投1休
乳	ハラヴェン	EBL	ハラヴェン	2投1休
乳	フルベストラント	FUL	フェンロデックス	4週毎